

Gastroskopia

Informacje dla Pacjenta

Gastroskopia – jest to badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka i dwunastnicy). Jest najlepszym sposobem na zlokalizowanie zmian chorobowych w wyżej opisanym fragmencie przewodu pokarmowego takich jak: zmiany zapalne, polipy, wrzody czy zmiany nowotworowe.

W trakcie badania jest także **możliwość pobrania wycinków do dalszej analizy** w celu pogłębienia diagnostyki.

Badanie to może mieć również zastosowanie terapeutyczne: tamowanie krwawienia, leczenie żylaków przełyku, usuwanie polipów.

Jakie są wskazania do gastroskopii?

- Bóle brzucha, dyspepsja, wymioty o niejasnej przyczynie.
- Objawy choroby refluksowej, zaburzenia połykania.
- Bóle w klatce piersiowej o niejasnej przyczynie.
- Przewlekła biegunka.
- Marskość wątroby.
- Utrata masy ciała.
- Niedokrwistość.

Jak się przygotować?

- Przez 6 godzin przed badaniem nic nie jedz. Jeśli przyjmujesz leki, które spowalniają opróżnianie żołądka, nie jedz przez 8 godzin. Twój ostatni posiłek powinien być lekkostrawny.
- Przez 2 godziny przed badaniem nic nie pij, nie pal papierosów, nie żuj gumy.

Co ze sobą przynieść?

- Wyniki poprzednich badań diagnostycznych i wypisy ze szpitala (jeśli mają związek z badaniem).
- Jeżeli używasz okularów do czytania – zabierz je ze sobą.

Leki

- W dniu badania zażyj leki przyjmowane na stałe popijając niewielką ilością wody.
- Jeżeli chorujesz na cukrzycę skonsultuj z lekarzem kierującym na badanie sposób przygotowania do gastroskopii - poinformuj o chorobie w trakcie rejestracji na badanie.
- Jeśli bierzesz leki zmniejszające krzepliwość krwi, to omów z lekarzem kierującym czy należy je odstawić i w jakim odstępie czasu przed wyznaczoną datą badania.
- Jeżeli przyjmujesz leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego (np.: Controloc, Emanera, Polprazol, Dexilant) to odstaw je na 14 dni przed gastroskopią.
- Jeżeli byłeś leczony antybiotykiem w ciągu 30 dni poprzedzających gastroscopię to – przesun termin badania (o ile nie jest to badanie w trybie pilnym).
- Przynieś ze sobą listę przyjmowanych na stałe leków.

Gastroskopia

Informacje dla Pacjenta

Jak przebiega badanie?

- Przed zabiegiem gardło jest znieczulane lidokainą, która łagodzi odczucia bólowe i odruch wymiotny pojawiający się w trakcie badania.
- Pacjent kładzie się na lewym boku.
- Lekarz lub pielęgniarka zakłada ustnik, przez który wprowadza endoskop – giętki przewód z kamerką i światłem.
- Badanie trwa zwykle od 5 do 7 minut.
- Po każdym badaniu endoskop jest myty i dezynfekowany.
- Wycinki do badania pobierane są jednorazowymi narzędziami.

Co zrobić po badaniu?

- Nie jedz nic i nie pij przez ok. 0,5 do 2 godzin po zakończonym badaniu. Dokładne instrukcje otrzymasz od personelu przeprowadzającego badanie.



- Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu.
- Przed badaniem niezbędne będzie zapoznanie się i podpisanie zgody na zabieg, dlatego prosimy o przybycie 30 minut przed wyznaczonym terminem badania.
- Badanie może wiązać się z dodatkowymi opłatami, jeśli konieczne będzie usunięcie zmian, pobranie dodatkowych wycinków lub wykonanie go w znieczuleniu – nie dotyczy to badań wykonywanych w ramach ubezpieczenia NFZ.